




DE NIJS

Maybell

Santana x Triplo

J.P. van Loon

Algemeen advies voor de consumptieteelt



Middenlaat ras met vroege knolzetting

Geschikt voor friet

Smaakvolle tafelaardappel

Heldere schilkleur

Geeft mooie partijen

Raseigenschappen

Rijptijd	5,5	midden
Opkomst	6	redelijk
Loofontwikkeling	7,5	goed
Bessen	1	zeer weinig
Schilkleur	3	geel
Vleeskleur	7	licht geel
Knolvorm	0/0	ovaal - lang ovaal
Oogdiepte	6,5	redelijk vlak
Regelmaat knolvorm	7,5	uniform
Grootte knol	8,5	zeer groot
Sortering	7	uniform
Knolaantal	8-11	laag
Opbrengst 90 dagen %	105	
Opbrengst 120 dagen %	123	

Raskwaliteiten

Kiemrust	8	lang
Onderwatergewicht	365	
Droge stof %	19,94	
Zetmeel %	14,06	
Kooktype	B - BC	iets vast-iets kruimig
Verkleuring	8	geen
Frites	7,5	goed
Chips	-	n.v.t

Gebruik



Resistenties / toleranties

Aardappelmoetheid	-	geen
Wratziekte	-	geen
Onderzeeërvorming	-	onbekend
Sencorgevoeligheid	-	onbekend
Phytophthora loof	6	weinig vatbaar
Phytophthora knol	6,5	weinig vatbaar
Alternaria	-	onbekend
Erwinia	-	onbekend
Doorwas	7,5	weinig gevoelig
Droogtetolerantie	8,5	tolerant
Hittetolerantie	8,5	tolerant

Resistenties / toleranties

Y-virus	7	weinig vatbaar
Yntn-virus	-	onbekend
Kringerigheid	7	resistent
Rooibeschatiging	7	weinig gevoelig
Blauwgevoeligheid	6-10	weinig gevoelig
Fusarium	-	onbekend
Zilverscurft	5,5	vatbaar
Scurft	6	weinig vatbaar
Poederscurft	6	weinig vatbaar



DE NIJS

Maybell

Santana x Triplo

J.P. van Loon

Algemeen advies voor de consumptieteelt

Voorbehandeling pootgoed en poten

- Maybell heeft een goede kiemrust, het gebruik van voorgekiemd pootgoed is effectief. Verwijder de topspruit voor het verkrijgen van meer stengels.
- Poot rond 1 à 2 cm onder maaiveld diepte en in warme grond.
- Later poten zorgt voor een hoger aantal stengels.
- Voor het poten grond/knollen behandelen tegen *Rhizoctonia*, *fusarium* en zilverschurft.

Pootafstanden

*Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden.

Pootgoed maat	28/35	35/55	55/65
Plantafstand	27-30 cm	31-35cm	37-40 cm

Bemesting (inclusief bodemvoorraad)

N	± 150 kg	Inclusief N-min (100 kg voor het poten, eventueel rest als overbemesting)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	Normaal	Volgens bodemanalyse, gebruik geen chloorhoudende kali (verlaagt OWG)
Mg, Mn, Ca, Bo		als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit

Wees voorzichtig met het gebruik van organische mest, dit kan de afrijping beïnvloeden.

Teelt

- Maybell komt goed op, heeft een goed dekkende loofontwikkeling en is sterk.
- Zorg bij het frezen/aanaarden voor een goede brede/volle rij.
- Loofrijping is middenlaat, met extreem vroege knolzetting, laag tal en daardoor snel vroeg grof.
- Het ras is sterk tegen hitte en droogte.
- Normale Phytophthorabesputingen uitvoeren, later in het seizoen overgaan op middelen met meer knolbescherming.
- Het is raadzaam om het gewas regelmatig te controleren op luizen, indien nodig kan tijdens de Phytophthorabesputing een luizenbestrijding mee worden gespoten.

Loofdoding, oogst en bewaring

- Een rijpend gewas is nodig voor een goed OWG en beperking voor rooibeschatiging, 3 weken afharderen.
- Maybell is weinig gevoelig voor rooibeschatiging, wees voorzichtig met rooien en inschuren!
- Zorg ervoor dat de partij snel droog is en blijft. Zorg dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 6-7°C. Voorkom condensvorming in de bovenlaag van de hoop!
- Wees bij het afleveren voorzichtig met de grove aardappelen, deze zijn gevoeliger voor beschadigingen.