



# DE NIJS

# Roslin

FOB02-136-66R x Red Valentine

J. Heidemans / Fobek

## Algemeen advies voor de consumptieteelt



Vroeg

Grove knollen

Hoge opbrengst in Middellandse Zeegebied

Weinig gevoelig voor stootblauw

Sterk tegen doorwas en wind

### Raseigenschappen

Rijptijd	7	vroeg
Opkomst	5,5	redelijk
Loofontwikkeling	7	goed
Bessen	6	redelijk veel
Schilkleur	7	rood
Vleeskleur	5	crème wit
Knolvorm	llo	lang - lang ovaal
Oogdiepte	7	vlak
Regelmaat knolvorm	7	uniform
Grootte knol	8	groot
Sortering	7	uniform
Knolaantal	8-11	laag
Opbrengst 90 dagen %	114	
Opbrengst 120 dagen %	104	

### Raskwaliteiten

Kiemrust	7	lang
Onderwatergewicht	336	
Droge stof %	18,51	
Zetmeel %	12,68	
Kooktype	A - AB	vast-iets vast
Verkleuring	6,5	zeer licht
Frites	-	n.v.t.
Chips	-	n.v.t.

### Gebruik



### Resistenties / toleranties

Aardappelmoetheid	Ro1,4	AF
Wratziekte	1	immuun
Onderzeeërvorming	-	onbekend
Sencorgevoeligheid	-	onbekend
Phytophthora loof	4	vatbaar
Phytophthora knol	7	weinig vatbaar
Alternaria	-	onbekend
Erwinia	-	onbekend
Doorwas	7,5	weinig gevoelig
Droogtetolerantie	7	weinig gevoelig
Hittetolerantie	7,5	weinig gevoelig

### Resistenties / toleranties

Y-virus	6	vatbaar
Yntn-virus	-	onbekend
Kringerigheid	5	vatbaar
Rooibeschatiging	-	onbekend
Blauwgevoeligheid	6-10	weinig gevoelig
Fusarium	-	onbekend
Zilverschurft	5,5	vatbaar
Schurft	5,5	weinig vatbaar
Poederschurft	7	resistent



**DE NIJS**

# Roslin

FOB02-136-66R x Red Valentine

J. Heidemans / Fobek

## Algemeen advies voor de consumptieteelt

### Voorbehandeling pootgoed en poten

- Dit ras heeft een lange kiemrust, het gebruik van voorgekiemd pootgoed is daarom zeer effectief.
- Poot de aardappel op maaivelddiepte en in voldoende warme grond met een goede structuur!
- Voor het poten knollen behandelen tegen *Rhizoctonia* en zilverschurft.
- De aardappel kan gepoot worden op iets schurftgevoelige grondsoorten.

### Pootafstanden \*Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden.

Pootgoed maat	28/35	35/55	55/65	35/55 gesneden
Plantafstand	-	30-36 cm	-	30 cm

### Bemesting (inclusief bodemvoorraad)

N	± 180 - 220 kg	Inclusief N-min (2/3 voor poten, de rest als overbemesting)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	Normaal	Volgens bodemanalyse
Mg, Mn, Ca, Bo		Als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit

### Teelt

- Het ras heeft een redelijke opkomst met een goede loofontwikkeling.
- Het is nog onbekend of het ras tegen Sencor (Metribuzin) kan!
- Het ras is bestand tegen een klimaat met harde wind (is ongevoelig voor windschade).
- Houd een strak schema voor Phytophthorabesputingen aan, dit omdat het ras vatbaar is in het loof.
- Het is raadzaam om het gewas regelmatig te controleren op luizen, indien nodig kan tijdens de Phytophthorabesputing een luizenbestrijding mee worden gespoten.

### Loofdding, oogst en bewaring

- Na loofvernietiging de aardappelen voldoende laten afharden, kijk ook naar de rijpheid van het gewas.
- Zorg voor een snelle droging om zilverschurft te voorkomen (gebruik desnoods kachels). Zorg ervoor dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 5-6°C.